


子宮頸がん予防ワクチン あなたの接種スケジュール

シルガード9(9価)を受ける場合



接種した
月日を記入
しましょう。



【接種間隔の考え方】


1か月以上の間隔をおいた日とは、翌月の同日以降を意味します。翌月に同日が存在しない場合は、その翌日(1日)となります。3か月以上の間隔をおいた日も同様の考え方です。
例：9月30日の1か月後は10月30日、
1月30日の1か月後は3月1日。

標準的な接種スケジュール

シルガード9(9価)

※1回目を**15歳になるまでに**受ける場合

少なくとも5か月以上あけます。
5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。



標準的な接種スケジュール

シルガード9(9価)

※1回目を**15歳になってから**受ける場合

2回目は1回目から1か月以上、
3回目は2回目から3か月以上あけます。




子宮頸がん予防ワクチン あなたの接種スケジュール

サーバリックス(2価)・ガーダシル(4価)を受ける場合



接種した
月日を記入
しましょう。




【接種間隔の考え方】

1か月以上の間隔をおいた日とは、翌月の同日以降を意味します。翌月に同日が存在しない場合は、その翌日(1日)となります。3か月以上の間隔をおいた日も同様の考え方です。
例：9月30日の1か月後は10月30日、
1月30日の1か月後は3月1日。

標準的な接種スケジュール

サーバリックス (2価)

2回目は1回目から1か月以上、
3回目は1回目から5か月以上
かつ2回目から2か月半以上
あけます。




合計
3回

標準的な接種スケジュール

ガーダシル (4価)

2回目は1回目から1か月以上、
3回目は2回目から3か月以上
あけます。



合計
3回

※2価・4価いずれも1年以内に接種を完了することが望ましい